

猩紅熱

由A型鏈球菌所引起的，臨床症狀包括發燒、喉嚨痛、草莓舌、沙粒狀會癢的皮疹。皮疹由鏈球菌的紅斑毒素所引起，常出現頸部、胸部、腋窩、手肘、腹股溝、大腿內側。典型的皮疹不出現在臉部，但臉部會潮紅，口周圍泛白。嚴重的感染常伴有高燒、噁心、噁吐，通常食慾與活動力會明顯變差，值得注意的是因為皮疹會癢，有些個案會被當作過敏性疾病而延遲治療的時間。

疾病在恢復期可以出現患者的手指、手掌、腳掌、腳指尖及腳指脫皮。猩紅熱最可怕的地方，是如果治療不徹底，可能引起急性風濕熱、風濕性心臟病、急性絲球腎炎等疾病。

目前尚無疫苗可預防，衛生單位應加強疫情通報，家長特別小心不要抵抗力不好的空氣欠佳的公共場所，如果不幸被傳染，應徹底治療（有效抗生素給予十天）。

● 猩紅熱其傳染途徑？

猩紅熱曾經是法定傳染病，主要是經由飛沫傳染，是由鏈球菌所引起，潛伏期為一至三天，好發於學齡前兒童。

● 症狀為何？

主要症狀有發燒、喉嚨痛、草莓舌及皮疹。如不治療有可能引發腎炎、風濕熱、心臟病。

● 診斷與治療？

1. 由臨床症狀及實驗室檢驗，可確定診斷猩紅熱。
2. 目前已有藥物可以治療，請洽醫師診治。
3. 如已確定感染須隔離治療及消毒任何曾受鼻咽分泌物汙染物品。

● 如何預防？

1. 請盡量避免出入公共場所，不要與疑似病患接觸。
2. 加強個人衛生，請常洗手。注意居家環境衛生及通風。

諮詢專線：04-24632000分機 52781 新生兒加護病房
分機 52785 病嬰室

諮詢時間：週一至週五 09:00~17:30