

坐浴盆使用方法

使用目的：

- 1.減輕會陰傷口疼痛並促進會陰傷口癒合
- 2.促進會陰周圍血液循環

使用者：

產後會陰疼痛者

使用方法：

- 1.於生產 2 4 小時以後使用。
- 2.將水袋注入溫熱水，同時加入一瓶蓋（約2cc）的優碘藥水。
- 3.將馬桶坐墊掀起後，將坐浴盆置放固定於馬桶上，以溫水注入盆內。
- 4.浸泡會陰傷口，一次10-15分鐘，一天浸泡3-4次。
- 5.浸泡完畢，擦拭會陰傷口，保持乾淨。
- 6.將浸泡過的水倒掉即可。
- 7.在您出院時會讓您帶優碘回家浸泡會陰傷口及 會陰沖洗。
- 8.若您預計再生下一胎，請將坐浴盆保存，可重複使用。

諮詢專線：04-24632000 分機32861、32863

諮詢時間：24小時諮詢專線

坐浴盆使用方法

使用目的：

- 1.減輕會陰傷口疼痛並促進會陰傷口癒合
- 2.促進會陰周圍血液循環

使用者：

產後會陰疼痛者

使用方法：

- 1.於生產 2 4 小時以後使用。
- 2.將水袋注入溫熱水，同時加入一瓶蓋（約2cc）的優碘藥水。
- 3.將馬桶坐墊掀起後，將坐浴盆置放固定於馬桶上，以溫水注入盆內。
- 4.浸泡會陰傷口，一次10-15分鐘，一天浸泡3-4次。
- 5.浸泡完畢，擦拭會陰傷口，保持乾淨。
- 6.將浸泡過的水倒掉即可。
- 7.在您出院時會讓您帶優碘回家浸泡會陰傷口及 會陰沖洗。
- 8.若您預計再生下一胎，請將坐浴盆保存，可重複使用。

諮詢專線：04-24632000 分機32861、32863

諮詢時間：24小時諮詢專線