

常用管路介紹說明

鼻胃

- 作用：1.無法由口進食時，自鼻胃管灌食。
2.胃部引流，減少嘔吐腹脹。
- 位置：由鼻部經過咽喉，放至胃部。
- 注意事項：1.置入時會感到喉嚨痛、鼻子癢。
2.勿拉扯壓迫。

導尿管

- 作用：引流並監測尿液的總量及顏色。
- 位置：由尿道口放入至膀胱。
- 注意事項：1.有尿意感是正常現象。
2.尿管不可扭曲或受壓，避免阻塞；而且勿拉扯，避免血尿出現。

傷口引流管

- 作用：引流傷口內部分泌物或血水。
- 部位：依手術部位放置
注意事項：勿拉扯、扭轉及壓迫，避免引流管脫落。

中心靜脈導管

- 作用：1.監測體內水分含量多寡，作為輸液的指標。
2.無法打上周邊靜脈血管時，作為點滴注射。
- 部位：頸部、鎖骨下或鼠蹊部。
- 注意事項：1.勿拉扯。
2.觀察注射部位有無滲血或血腫情形。

氣管內管、氣切套管

- 作用：1.建立呼吸道，保持呼吸道通暢。
2.連接呼吸器幫助呼吸，傳送氧氣。
3.抽痰。
- 位置：1.氣管內管是經由口或鼻插入至氣管。
2.氣切套管是在頸部經手術方式放入。
- 注意事項：1.插管時因為前端有一氣囊固定在聲帶，所以暫時無法說話。醫護人員會協助您利用其他溝通方式與您交談。請您放心。
2.插管後，您可能會覺得喉嚨有異物感且疼痛，我們將會為您解決疼痛問題，減輕您的不適。
3.請您千萬不可以把管子拔掉，因為可能會使喉嚨受傷、腫脹，再次插管困難，呼吸衰竭加劇，缺氧而危及生命。必要時會給予適時約束以免造成生命危險。
4.醫師會評估您的呼吸功能，視病情採漸進式呼吸訓練，予以拔除氣管內管或氣切套管。訓練時間的長短必須依您的病情而定。

動脈導管

- 作用：1.持續監測動脈血壓。
2.抽血。
- 部位：手腕、手肘、腹股溝、足背之動脈。
- 注意事項：1.注射部位關節勿彎曲。
2.勿拉扯導管，避免大出血。

諮詢專線：04-24632000

諮詢時間：週一至週五 09:00~17:30