

核子醫學檢查注意事項

◎ 檢查前：

1. 檢查前請詳閱說明書後填寫同意書。
2. 懷孕或授乳中婦女請務必提前告知醫護人員。

◎ 檢查後：

1. 核子醫學檢查所注入的放射性藥物劑量非常低，核醫檢查後您可維持一般正常活動。
2. 檢查後1日內應儘量不要抱嬰兒或親自哺乳，並保持約1公尺的距離，之後則無此限制。
3. 如廁後，馬桶請沖水2次，若使用尿布應丟棄於感染性廢棄物垃圾袋。
4. 無限水者，檢查完畢後可多喝水，以促進排尿，來降低身體所接受的輻射劑量。
5. 護理人員應採集中式護理，懷孕者應多加注意輻射安全。
6. 病人周圍的放射線劑量：病人家屬成員，或同病房病人等的劑量，由計算結果得知並不高，因此不必擔心。對周圍的人來說，雖然劑量低的不成問題，但接受劑量並沒有益處，應儘量避免長時間的接觸。

輻射防護三原則：

1. 時間：短
 2. 距離：長（遠）（1公尺）
 3. 保持清潔（核醫科病人），床單沾到體液、血液宜立即更換。
-

諮詢專線：04-24632000分機55204-7（核子醫學科）

諮詢時間：週一至週五 09:00~17:30

核子醫學檢查注意事項

◎ 檢查前：

1. 檢查前請詳閱說明書後填寫同意書。
2. 懷孕或授乳中婦女請務必提前告知醫護人員。

◎ 檢查後：

1. 核子醫學檢查所注入的放射性藥物劑量非常低，核醫檢查後您可維持一般正常活動。
2. 檢查後1日內應儘量不要抱嬰兒或親自哺乳，並保持約1公尺的距離，之後則無此限制。
3. 如廁後，馬桶請沖水2次，若使用尿布應丟棄於感染性廢棄物垃圾袋。
4. 無限水者，檢查完畢後可多喝水，以促進排尿，來降低身體所接受的輻射劑量。
5. 護理人員應採集中式護理，懷孕者應多加注意輻射安全。
6. 病人周圍的放射線劑量：病人家屬成員，或同病房病人等的劑量，由計算結果得知並不高，因此不必擔心。對周圍的人來說，雖然劑量低的不成問題，但接受劑量並沒有益處，應儘量避免長時間的接觸。

輻射防護三原則：

1. 時間：短
 2. 距離：長（遠）（1公尺）
 3. 保持清潔（核醫科病人），床單沾到體液、血液宜立即更換。
-

諮詢專線：04-24632000分機55204-7（核子醫學科）

諮詢時間：週一至週五 09:00~17:30